



الرياضيات

الصف الثامن - كتاب التمارين

الفصل الدراسي الثاني

8

فريق التأليف

د. عمر محمد أبوغليون (رئيساً)

نور محمد حسان

إبراهيم أحمد عمارة

هبه ماهر التميمي

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:

☎ 06-5376262 / 237 ☎ 06-5376266 ✉ P.O.Box: 2088 Amman 11941

📌 @nccdjor 📌 feedback@nccd.gov.jo 📌 www.nccd.gov.jo

قرّرت وزارة التربية والتعليم تدرّيس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (2021/5)، تاريخ 2021/12/7 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2021/160) تاريخ 2021/12/21 م بدءاً من العام الدراسي 2021 / 2022 م.

© Harper Collins Publishers Limited 2021.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 193 - 3

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2021/6/3382)

373,19

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

الرياضيات الصف الثامن: كتاب التمارين الفصل الثاني / المركز الوطني لتطوير المناهج. - عمان: المركز، 2021

(43) ص.

ر.إ.: 2021/6/3382

الواصفات: / الرياضيات // المناهج // التعليم الاعدادي /

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه، ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

أعزّاءنا الطلبة ...

يحتوي هذا الكتاب تمارين متنوعة أعدت بعناية لتغنيكم عن استعمال مراجع إضافية، وهي استكمال للتمارين الواردة في كتاب الطالب، وتهدف إلى مساعدتكم على ترسيخ المفاهيم التي تتعلمونها في كل درس، وتنمي مهارتكم الحسابية.

قد يختار المعلم/ المعلمة بعض تمارين هذا الكتاب واجبًا منزليًا، ويترك لكم البقية لتحلوها عند الاستعداد للاختبارات الشهرية واختبارات نهاية الفصل الدراسي.

تساعدكم الصفحات التي عنوانها (أستعد لدراسة الوحدة) في بداية كل وحدة على مراجعة المفاهيم التي درستوها سابقًا؛ مما يعزز قدرتكم على متابعة التعلم في الوحدة الجديدة بسلاسة ويسر.

يوجد فراغ كافٍ إزاء كل تمرين للكتابة إجابتها، وإذا لم يتسع هذا الفراغ لخطوات الحل جميعها فيمكنكم استعمال دفتر إضافي لكتابتها بوضوح.

تمنين لكم تعلمًا ممتعًا وميسرًا.

المركز الوطني لتطوير المناهج

قائمة المحتويات

الوحدة ⑤ المتباينات الخطية

- 6 أَسْتَعِدُّ لِدِرَاسَةِ الْوَحْدَةِ
- 8 الدرس 1 كتابة المتباينات وتمثيلها
- 9 الدرس 2 حل متباينات بمتغير واحد بالجمع والطرح
- 10 الدرس 3 حل متباينات بمتغير واحد بالضرب والقسمة
- 11 الدرس 4 حل متباينات متعددة الخطوات

الوحدة ⑥ أنظمة المعادلات الخطية

- 12 أَسْتَعِدُّ لِدِرَاسَةِ الْوَحْدَةِ
- 14 الدرس 1 حل نظام من معادلتين خطيتين بيانياً
- 15 الدرس 2 حل نظام من معادلتين خطيتين بالتعويض
- 16 الدرس 3 حل نظام من معادلتين خطيتين بالحذف

الوحدة ⑦ الأشكال ثنائية الأبعاد

- 17 أَسْتَعِدُّ لِدِرَاسَةِ الْوَحْدَةِ
- 19 الدرس 1 إثبات توازي المستقيمات وتعامدها
- 20 الدرس 2 متوازي الأضلاع

قائمة المحتويات

- الدرس 3 تمييز متوازي الأضلاع 21
- الدرس 4 حالات خاصة من متوازي الأضلاع 22
- الدرس 5 تشابه المثلثات 23
- الدرس 6 التمدد 24

الوحدة 8 الأشكال ثلاثية الأبعاد

- أستعد لدراسة الوحدة 25
- الدرس 1 رسم الأشكال ثلاثية الأبعاد 27
- الدرس 2 المقاطع والمجسمات الدورانية 30
- الدرس 3 حجم الكرة ومساحة سطحها 31

الوحدة 9 الإحصاء والاحتمالات

- أستعد لدراسة الوحدة 32
- الدرس 1 الربيعيات 34
- الدرس 2 اختيار التمثيل الأنسب 35
- الدرس 3 عد النواتج 36
- الدرس 4 احتمال الحوادث المركبة 37
- ورقة منقطة متساوية القياس 38

المتباينات الخطية

أستعدُّ لدراسة الوحدة

أختبرُ معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة، أستعينُ بالمثال المحلول.

تحويل الجمل اللفظية إلى مقادير جبرية

أكتبُ مقدارًا جبريًا يمثلُ كلاً مما يأتي:

- 1 عددًا مضافًا إليه 5
- 2 مثلي عددٍ مطروح منه 10
- 3 ناتج قسمة عددٍ على 6
- 4 5 أمثال عددٍ مطروحٍ من 20

مثال: أكتبُ مقدارًا جبريًا يمثلُ الجملة «4 أمثال عددٍ مطروحٍ منه 17»

x	العدد
$4x$	أربعة أمثال العدد
$4x - 17$	طرح 17 من 4 أمثال العدد

إيجاد قيمة مقدارٍ جبريٍّ عند قيمةٍ معطاةٍ

أجدُ قيمة كلٍّ من المقادير الآتية عند القيمة المعطاة:

- 1 $2x + 3, x = -2$
- 2 $8 - 4h, h = 5$
- 3 $(3k - 1) \div 2, k = 3$

مثال: أجدُ قيمة المقدار الجبري $17 + 5k$ إذا كانت $k = -3$

$$\begin{aligned}
 17 + 5k &= 17 + 5(-3) && \text{أعوّض عن } k \text{ بـ } -3 \\
 &= 17 + -15 && \text{أتبع أولويات العمليات، فأضربُ أولًا} \\
 &= 2 && \text{أجمع}
 \end{aligned}$$

تبسيط المقادير الجبرية

أبسط كلاً من المقادير الجبرية الآتية:

1 $4(n-3)$

2 $7(1-x)$

3 $8(6y-11)$

4 $2x + 3(x-1)$

5 $5(3 - 2y) + 6y$

6 $25(4z - 3 - 2z)$

مثال: أبسط المقدار الجبري $5x + 2(x-3) + 4$

$$\begin{aligned} 5x + 2(x-3) + 4 &= 5x + 2x - 6 + 4 \\ &= 7x - 2 \end{aligned}$$

خاصية التوزيع
أجمع

حل المعادلات

أحل كلاً من المعادلات الآتية:

1 $x + 4 = -2$

2 $8 = y - 2$

3 $-4.5 + u = 6.5$

4 $4m = -24$

5 $\frac{n}{5} = -1$

6 $7.5 = \frac{h}{-2}$

7 $2(4x + 1) = 16$

8 $3 - 2b = -5(b + 2) - 1$

مثال: أحل المعادلة $2(3x + 4) = 4x + 17$

$$\begin{aligned} 2(3x + 4) &= 4x + 17 \\ 6x + 8 &= 4x + 17 \\ 6x + 8 - 8 &= 4x + 17 - 8 \\ 6x - 4x &= 4x - 4x + 9 \\ \frac{2x}{2} &= \frac{9}{2} \\ x &= 4.5 \end{aligned}$$

المعادلة الأصلية
خاصية التوزيع
أطرح 8 من طرفي المعادلة
أطرح $4x$ من طرفي المعادلة
أقسم طرفي المعادلة على 2
أبسط

أكتب متباينة تمثل كل جملة مما يأتي:

- 1 تعليم جامعي: الحد الأدنى للمعدل الثانوية العامة اللازم لتقديم طلب الالتحاق بكلية الطب البشري في المملكة الأردنية الهاشمية 85%
- 2 كرة قدم: يجب أن يكون عمر اللاعب في فريق الناشئين لكرة القدم أقل من 17 سنة.
- 3 عدد مطروح منه 1 أكبر من 13
- 4 ثلاثة أمثال عدد أقل من 20





أبين ما إذا كانت القيمة المعطاة تمثل أحد حلول المتباينة أم لا في كل مما يأتي:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 5 $9 - x > 4, x = 3$ | 6 $k + 6 < -5, k = -4$ | 7 $7u + 1 \geq 15, u = 2$ |
| 8 $\frac{8+z}{z} \leq -2, z = -4$ | 9 $r + 4 > 8, r = 2$ | 10 $5 - x < 11, x = -7$ |

أمثل كل متباينة مما يأتي على خط الأعداد:

- | | | |
|---------------|------------|----------------|
| 11 $y > -5$ | 12 $x < 0$ | 13 $w \geq 6$ |
| 14 $h \leq 5$ | 15 $w < 8$ | 16 $z \geq -1$ |

أكتب المتباينة الممثلة على خط الأعداد في كل مما يأتي:



X

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x + 2 &\leq 6 \\ \frac{1}{2}(8) + 2 &\stackrel{?}{\leq} 6 \\ 4 + 2 &\stackrel{?}{\leq} 6 \\ 6 &\leq 6 \end{aligned}$$

21 أكتشف الخطأ: يقول عامر: إن العدد 8 لا يمثل حلاً

$$\frac{1}{2}x + 2 \leq 6$$

أكتشف الخطأ في ما يقوله عامر، وأصححهُ.

أحل كل متباينة، وأمثلها على خط الأعداد وأتحقق من صحة الحل:

1 $m - 3 < 1$

2 $5 < m + 3$

3 $y + 1.5 \geq 9.5$

4 $-7.6 \leq -0.6 + r$

5 $-1 \geq x - 9$

6 $3 \leq \frac{1}{2} + a$

إذا كان $x + 6 \geq 20$ ، فأكمل كل متباينة:

7 $x \geq \dots$

8 $x + \dots \geq 24$

9 $x - 6 \geq \dots$

اكتب أصغر عدد صحيح y يحقق كل متباينة مما يأتي:

10 $y - 3 > 5$

11 $y - 7 \geq 6$


اكتب أكبر عدد صحيح d يحقق كل متباينة:

12 $d + 3 < -2$

13 $d - 4 \leq -2$



- 14 **بيئة:** هاني عضو في نادي البيئة، ويطمح إلى بيع 15 شتلة على الأقل خلال ثلاثة أيام في معرض «الأرض» الذي يقيمه النادي؛ لينفق ريعها في المحافظة على البيئة. إذا باع هاني 4 شتلات يوم الأحد، و5 شتلات يوم الإثنين، فكم شتلة عليه أن يبيع يوم الثلاثاء؟



- 15 **بيئ:** الشكل المجاور شكلاً رباعياً محيطه أقل من أو يساوي 18.7 cm

اكتب متباينة وأحلها لإيجاد قيم x المحتملة.

أكتب $>$ أو $<$ أو \leq أو \geq في لأكون عبارةً صحيحةً في ما يأتي:

2 إذا كان $u < 0$ فإن $0 < -u$

1 إذا كان $b > 7$ فإن $21 < 3b$

4 إذا كان $-3t \leq 18$ فإن $-6 < t$

3 إذا كان $-5 \geq \frac{1}{2}y$ فإن $-10 < y$

أحل المتباينات الآتية، وأمثلها بيانياً، وأتحقق من صحة الحل.

5 $0.5 \leq \frac{1}{4}y$

6 $-12 > 3x$

7 $\frac{2}{5}h < 10$

8 $-3.5 > 7b$

9 $-\frac{3}{5} \geq \frac{w}{5}$

10 $-\frac{9}{4} < -\frac{3}{8}b$



11 صناعات غذائية: يبلغ معدّل إنتاج مصنع من الألبان 120 علبة في الساعة، ويخطّط قسم الإنتاج في المصنع لإنتاج ما لا يقل عن 600 علبة يومياً. أكتب متباينةً وأحلّها لأجد الحد الأدنى من الساعات اليومية التي يجب أن يعمل بها المصنع لإنتاج الكميّة المطلوبة.

12 هندسة: مستطيل مساحته أقل من 85 cm^2 وطوله 20 cm . أكتب متباينةً تمثل العرض الممكن للمستطيل ثمّ أحلّها.

أبين ما إذا كانت كل من العبارات الآتية صحيحة دائماً أم صحيحة أحياناً أم غير صحيحة أبداً، موضّحاً ذلك بأمثلة مناسبة:

14 إذا كان $x < 0$ ، $b < 0$ فإن $bx > 0$

13 إذا كان $x > 4$ ، $a < 1$ فإن $ax > 0$

16 إذا كان $x > 0$ ، $d \geq 1$ فإن $dx > 0$

15 إذا كان $x \geq 0$ ، $c > 1$ فإن $cx > 0$

أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأتحرّق من صحّة الحلّ:

1 $x - 3 \leq 5$

2 $20 - 2x \geq 5$

3 $3 - 4x > 11$

4 $25 - 3x < 7$

5 $2(6 - x) < 9$

6 $\frac{10 - 2x}{5} \geq 4$

7 $3n + 14 > 8n - 13$

8 $\frac{6n - 2}{7} < 9$

9 $7x + 1 > 3x - 7$



10 يخطّط أعضاء اللّجنة الإداريّة في أحد النوادي الرياضيّة لبيع قمصانٍ تحمل اسم النّادي بمبلغ لا يقلُّ عن 500 JD خلال أسبوعٍ. إذا كان سعر القميص الواحد 2.5 JD ومَع نهاية اليوم الخامس كان إيراد النّادي من هذه المبيعات 375 JD، فأكتب متباينةً وأحلّها لأجد أقلَّ عددٍ من القمصانٍ يجبُ بيعه خلال اليومين الباقيين ليصل النّادي إلى هدفه.

أكتب قيمَ x التي تحقّق كلّ متباينة ممّا يأتي:

11 $2x - 14 < 38$ ، حيثُ x مربع كامل.

12 $4x - 6 \leq 15$ ، حيثُ x عددٌ صحيحٌ فرديٌّ موجبٌ.




13 لدى فارس 4 JD، إذا اشترى 8 علبٍ عصيرٍ وأعطى أخاه ديناراً واحداً، وبقي معه 60 قرشاً. أكتب متباينةً وأحلّها لأجد الحدّ الأعلى لسعرِ علبةِ العصيرِ الواحدِ.

في الشكل المجاور مستطيلٌ محيطه يقلُّ عن 40 cm

14 أكتب متباينةً بدلالة x تدلُّ على محيط المستطيلِ.

15 أحلّ المتباينة في السؤال السابق.



أنظمة المعادلات الخطية

أستعد لدراسة الوحدة

أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة، أستعين بالمثال المحلول.

تمثيل المعادلات في المستوى الإحداثي باستعمال المقطع x والمقطع y

أمثل كل معادلة مما يأتي بياناً باستعمال المقطع x والمقطع y :

1 $2x - y = 4$

2 $x + 3y = -9$

3 $4x + 6y = 12$


مثال: أمثل المعادلة $3x + 4y = 12$ باستعمال المقطع x والمقطع y :

الخطوة 1: أجد المقطع x والمقطع y .

$3x + 4y = 12$	المعادلة الأصلية	$3x + 4y = 12$	المعادلة الأصلية
$3(0) + 4y = 12$	أعوّض $x = 0$	$3x + 2(0) = 12$	أعوّض $y = 0$
$\frac{4y}{4} = \frac{12}{4}$	أقسم طرفي المعادلة على 4	$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3}$	أقسم طرفي المعادلة على 3
$y = 3$	أبسط	$x = 4$	أبسط

إذن، المقطع x هو 4 والمقطع y هو 3

الخطوة 2: أرسم مستقيماً يصل بين المقطعين.



بما أن المقطع x هو 4، فإن المستقيم يقطع المحور x في النقطة $(4, 0)$ ، وبما أن المقطع y هو 3، فإن المستقيم يقطع المحور y في النقطة $(0, 3)$. أمثل النقطتين في المستوى الإحداثي، ثم أرسم مستقيماً يصل بينهما.


تمثيل المعادلات في المستوى الإحداثي باستخدام الميل والمقطع

أمثل كل معادلة مما يأتي بياناً باستخدام الميل والمقطع y :

1 $y + 4 = x$

2 $6x - y = -1$

3 $4x + 5y = 20$



مثال: أمثل المعادلة $y = \frac{1}{2}x - 3$ باستخدام الميل والمقطع y :

الخطوة 1: المقطع y هو -3 ، إذن أعيّن النقطة $(0, -3)$ في المستوى الإحداثي.

الخطوة 2: أستعمل الميل $\frac{1}{2}$ لتعيين نقطة أخرى في المستوى. أبدأ من النقطة $(0, -3)$ ، وأتحرك وحدتين لليمين، ثم وحدة للأعلى.

الخطوة 3: أرسم مستقيماً يمرُّ بالنقطتين.

حل المعادلة الخطية بمتغير واحد

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية:

1 $2x + 10 = 22$

2 $3x - 4 = 2x + 8$

3 $5t + 9 = t - 7$

مثال: أحلُّ المعادلة: $4x - 6 = 6 - 2x$

$$4x - 6 = 6 - 2x$$

$$4x - 6 + 2x = 6 - 2x + 2x$$

$$6x - 6 + 6 = 6 + 6$$

$$\frac{6x}{6} = \frac{12}{6}$$

$$x = 2$$

المعادلة الأصلية


أجمع $2x$ إلى طرفي المعادلة

أجمع 6 إلى طرفي المعادلة

أقسم طرفي المعادلة على 6

أبسّط

أستعملُ التمثيلَ البيانيَّ المجاورَ لأجدَ حلَّ كلِّ نظامٍ معادلاتٍ مما يأتي:



1 $y = x$

$y = 6 - 2x$

2 $2x + 3y = 6$

$y = 6 - 2x$

3 $y = 6 - 2x$

$y + 2x = -2$

4 $2x + 3y = 6$

$y + 2x = -2$

أحلُّ كلًّا من أنظمة المعادلات الخطية الآتية بيانيًا:

5 $y = -x + 4$

$y = 2x - 8$

6 $y = 3x - 1$

$y = 7 - x$

7 $y = 5x - 5$

$y = 5x + 3$

8 $2x + y = -3$


$2x - y = 11$

9 $6x + 3y = 15$

$2x - y = 5$

10 $y = 3x + 3$

$y = x + 3$



بيِّن الشكلَ المجاورُ التمثيلَ البيانيَّ للمعادلة $2x + 3y = 13$

11 أمثل المعادلة $2y = x - 3$ على المستوى الإحداثي نفسه.

12 أجدُ حلَّ النظام:

$2x + 3y = 13$

$2y = x - 3$

13 **حفلة زواج:** يرغبُ زيادٌ بتقديم وجبة طعامٍ للمدعوينَ إلى حفلٍ زواجهِ بقاعةِ الاحتفالاتِ لأحدِ الفنادقِ، وقد حصلَ

على عرضينَ منَ فندقينَ، الفندقُ A يتقاضى 500 دينارٍ مقابلَ خدماتِ الطعامِ للمدعوينَ إضافةً إلى 20 دينارًا عن كلِّ


مدعوٍّ، والفندقُ B يتقاضى 800 دينارٍ مقابلَ خدماتِ الطعامِ للمدعوينَ إضافةً إلى 16 دينارًا عن كلِّ مدعوٍّ، ما عددُ

المدعوينَ عندما تتساوى تكاليفُ الحفلِ في الفندقينَ؟

اكتب بجانب كل نظام معادلات مما يأتي رمز التمثيل البياني المناسب له، مبرراً إجابتك:


1 $y = x - 2$

$y = -2x + 1$




2 $y = x - 3$

$y = -\frac{1}{3}x + 1$



3 $y = \frac{1}{2}x - 2$

$y = 4x + 5$



أحل كلًّا من أنظمة المعادلات الآتية مستعملًا التعويض:

4 $y = x + 1$

$x + y = 7$

5 $y = x + 5$

$2x + 3y = 15$

6 $x = 3 - y$

$x - y = -1$

7 $\frac{1}{4}x - 2y = 0$

$y = 17 - 2x$

8 $3x - 4y = 2$

$y - 3x = -5$

9 $y - x = 3$

$y - 2x = 1$

10 $2x - y = 14$

$\frac{1}{2}y + x = 9$

11 $5x - 3y = 18$

$-2x + 2y = -8$

12 $y + 3x = -5$

$y + 6x = -11$

13 تملك فاتن وفدوى JD 75، فإذا كان المبلغ الذي تملكه فدوى مثلي المبلغ الذي تملكه فاتن، فأكتب نظامًا من معادلتين خطيتين يمثل المسألة، ثم أحله لأجد المبلغ الذي تملكه كل منهما.

14 أعمار: عمر طارق يساوي ثلاثة أمثال عمر أخته صفاء، إذا كان مجموع عمريهما يساوي 36 سنة، فكم عمر كل منهما؟

15 كتب: مجموع عدد صفحات كتابين سيقراهما جلال 150 صفحة إذا كان عدد صفحات

الكتاب الأول يقل عن نصف عدد صفحات الكتاب الثاني بمقدار 15 صفحة، فكم صفحة

في كل كتاب؟

16 أعداد: كتبت علياء عددتين مجموعهما 37، والفرق بينهما يساوي 14، فما العددان؟



أستعملُ الحذفَ لحلِّ كلِّ من أنظمة المعادلات الآتية:

1 $3x + 2y = 11$
 $2x - 2y = 14$

2 $3x - 4y = 17$
 $x - 4y = 3$

3 $2y + 3x = 16$
 $x - 2y = 4$

4 $2x + 5y = 37$
 $y = 11 - 2x$

5 $4x - 3y = 7$
 $x = 13 - 3y$

6 $4x - y = 17$
 $x = 2 + y$

7 $2x + 3y = 13$
 $x + 2y = 7$

8 $3x + 3 = 3y$
 $2x - 6y = 2$

9 $2x - 6 = 4y$
 $7y = -3x + 9$



10 ألعاب أولمبية: خلال إحدى دورات الألعاب الأولمبية، فازت دولة بـ 32 ميدالية ذهبية وفضية، وكان مثلاً عدد الميداليات الفضية التي فازت بها يزيد بمقدار 4 عن عدد الميداليات الذهبية. أكتب نظاماً من معادلتين خطيتين يمثل المسألة، ثم أحله لأجد عدد الميداليات الذهبية والفضية التي فازت بها الدولة.

11 حلّت هند نظام المعادلات الآتي فوجدت أن $x = 5, y = 6$:

$$4x - 2y = 8$$

$$2x - y = 4$$

أبرر لماذا لا يمكن أن يكون ما أوجدته هند حلاً وحيداً لهذا النظام من المعادلات.

12 أكتشف المختلف: أي أنظمة المعادلات الآتية مختلف؟ أبرر إجابتي.

$$3x + 3y = 3$$

$$2x - 3y = 7$$

$$-2x + y = 6$$

$$2x - 3y = -10$$

$$6x - 2y = 5$$

$$3x - y = 3$$


$$2x + 3y = 11$$

$$3x - 2y = 10$$

أستعد لدراسة الوحدة


أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة، أستعين بالمثل المحلول.

المستقيمت المتوازية وأزواج الزوايا



في الشكل المجاور، إذا كان $m\angle 9 = 75^\circ$ ، فأجد كلاً مما يأتي:

- 1 $m\angle 3$ 2 $m\angle 5$ 3 $m\angle 6$
4 $m\angle 8$ 5 $m\angle 11$ 6 $m\angle 12$



مثال: في الشكل المجاور، إذا كان $m\angle 3 = 133^\circ$ ، فأجد كلاً مما يأتي:

a) $m\angle 5$

$$m\angle 5 = 133^\circ$$

$\angle 5$ تبادل $\angle 3$ داخلياً

b) $m\angle 7$

$$m\angle 7 = 133^\circ$$

$\angle 7$ تقابل بالرأس $\angle 5$

c) $m\angle 2$

$$m\angle 2 + m\angle 3 = 180^\circ$$

زاويتان على مستقيم

$$m\angle 2 + 133^\circ = 180^\circ$$

$$m\angle 3 = 133^\circ \text{ عوّض}$$

$$m\angle 2 = 47^\circ$$

أطرح 133° من طرفي المعادلة

d) $m\angle 1$

$$m\angle 1 + m\angle 2 = 180^\circ$$

زاويتان على مستقيم

$$m\angle 1 + 47^\circ = 180^\circ$$

$$m\angle 2 = 47^\circ \text{ عوّض}$$






$$m\angle 1 = 133^\circ$$

أطرح 47° من طرفي المعادلة

الأشكال ثنائية الأبعاد

المضلعَات المتشابهة

أكتب أزواج الزوايا المتناظرة، ثم أجد عامل المقياس لزوج المضلعَات المتشابهة في كلِّ ممَّا يأتي:



مثال: في الشكل المجاور $\triangle ABC \sim \triangle DEF$

(1) أكتب أزواج الزوايا المتناظرة:

$$\angle A \cong \angle D, \quad \angle B \cong \angle E, \quad \angle C \cong \angle F$$

(2) أجد عامل المقياس.



لإيجاد عامل المقياس أجد النسبة بين طولَي ضلعين متناظرين:

$$\frac{CB}{FE} = \frac{24}{18} = \frac{4}{3}$$


إذن، عامل المقياس يساوي $\frac{4}{3}$

استعمال التشابه لإيجاد قياسات مجهولة

أجد قيمة x في كلِّ زوج من المضلعَات المتشابهة الآتية:



مثال: في الشكل المجاور إذا كان $\triangle EDF \sim \triangle NMP$ ، فأجد قيمة x .



$$\frac{MP}{DF} = \frac{NP}{EF}$$

$$\frac{24}{20} = \frac{30}{x}$$

$$24x = 600$$

$$x = 25$$







أكتب تناسبًا

أعوّض


بالضرب التبادلي

أقسم طرفي المعادلة على 24


أحدّد ما إذا كانت المعلومات الواردة في كلّ شكلٍ ممّا يأتي كافيةً لإثبات أن $m \parallel n$ ، وإن كانت كذلك فاستعملها لإثبات توازي المستقيمين:






8 في الشكل الآتي، إذا كانت $\angle 1 \cong \angle 2$ و $\angle 1 \cong \angle 3$ ، فأثبت أن $\overline{ST} \parallel \overline{UV}$ باستعمال البرهان السهمي.




7 في الشكل الآتي، إذا كان $s \parallel r$ و $\angle 5 \cong \angle 6$ ، فأثبت أن $m \parallel l$ باستعمال البرهان ذي العمودين.




أجد قيمة x التي تجعل $m \parallel l$ في كلّ ممّا يأتي:




12 نافذة: أحدّد أيّ المستقيمات في النافذة المجاورة متوازية. أبرر إجابتي باستعمال مسلمة أو نظرية.





أجد قِيَّاسَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي فِي $\square LMNQ$ الْمَجَاوِرِ، مَبْرَرًا إِجَابَتِي:







- 1 LM 2 LP 3 LQ 4 MQ
 5 $m\angle LMN$ 6 $m\angle NQL$ 7 $m\angle MNQ$ 8 $m\angle LMQ$




9 أجد قِيَّامَ كُلِّ مِنَ الْمَتَغَيِّرِينَ x وَ y فِي $\square PQRS$ الْمَجَاوِرِ إِذَا كَانَتْ:

$$PT = x + 2, \quad TR = y, \quad QT = 2x, \quad TS = y + 3$$


أجد قِيَّامَ الْمَتَغَيِّرَاتِ فِي كُلِّ مِنْ مَتَوَازِيَّاتِ الْأَضْلَاعِ الْآتِيَةِ:






17 فِي الشَّكْلِ الْآتِيِ، إِذَا كَانَ $RSTW$ وَ $XYZZ$ مَتَوَازِيَّيْنِ أَضْلَاعٍ، فَأَبْهِنُ أَنَّ $\angle R \cong \angle X$ بِاسْتِعْمَالِ الْبَرَهَانِ ذِي الْعَمُودَيْنِ.







16 فِي الشَّكْلِ الْآتِيِ $\square BCGH$ ، إِذَا كَانَ $\overline{HD} \cong \overline{FD}$ ، فَأَبْهِنُ أَنَّ $\angle F \cong \angle GCB$ بِاسْتِعْمَالِ الْبَرَهَانِ ذِي الْعَمُودَيْنِ.



أحدُ النظرية التي يمكنني استعمالها لأبين أن الشكل الرباعي في كلِّ ممَّا يأتي متوازي أضلاع:




أجد قيمة x و y اللتين تجعلان كلَّ شكلٍ رباعيٍّ ممَّا يأتي متوازي أضلاع:



7 أستعملُ المعلومات المعطاة في الشكل المجاور لكتابة برهانٍ سهميٍّ؛ لأثبت أن الشكل الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

8 أمثلُ الرؤوس $A(-5, -2)$, $B(-3, 3)$, $C(4, 3)$ في المستوى الإحداثي، ثمَّ أحددُ إحداثيات الرأس D الذي يجعلُ الشكل الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع، مبرراً إجابتي.






9 يقولُ عمادٌ: إنَّه يمكنُ إثبات أن الشكل الرباعي $JKLM$ متوازي أضلاع باستعمال عكسِ نظرية الأضلاع المتطابقة في متوازي الأضلاع. أكتشفُ الخطأ في قولِ عمادٍ.

إذا كان $ABCD$ مستطيلاً، فأجد طول كل قطر من قطريه في الحالات الآتية:





1 $AC = 2(x-3), BD = x + 5$

2 $AC = 2(5a + 1), BD = 2(a + 1)$


أجد قياسات الزوايا المرقمة في كل معين مما يأتي:



أحدد ما إذا كان متوازي الأضلاع في كل مما يأتي مستطيلاً أم معيناً أم مربعاً، مبرراً إجابتي:



في الشكل المجاور، إذا كان كل من $QRST$ و $QRTV$ معيناً، فأثبت أن ΔQRT متطابق أضلاع.



يبين الشكل المجاور المربع $XWZY$. إذا كان $WT = 3$ ، فأجد كلاً مما يأتي:


10 $m\angle WTZ$

11 $m\angle WYZ$

12 ZX

13 XY




X




$m\angle QRP = m\angle SQR$
 $x = 37$

14 **أكتشف الخطأ:** أنظر الحل المجاور، واكتشف الخطأ الوارد فيه، وأصححه، علماً بأن $PQRS$ معين.

أحد ما إذا كان كل مثلثين مما يأتي متشابهين أم لا، وإذا كانا كذلك فأكتب عبارة التشابه، مبرراً إجابتي.



أستعمل الشكل المجاور لأكمل كلاً من العبارات الآتية:



4 $\triangle CAG \sim$ _____

5 $\triangle DCF \sim$ _____

6 $\triangle ACB \sim$ _____

7 $m\angle ECF =$ _____


8 $m\angle ECD =$ _____

9 $CF =$ _____



10 $BC =$ _____

11 $DE =$ _____




12 **برج:** أجد ارتفاع البرج في الشكل الآتي مستعملاً تشابه المثلثات.









أجد قيمة المتغير x في كل زوج من أزواج المثلثات المتشابهة الآتية:



أجدُ معاملَ التمددِ في كلِّ ممَّا يأتي:



أنسخُ كلَّ مضلعٍ ممَّا يأتي على ورقةٍ مربعاتٍ، ثمَّ أرسُمُ صورتهُ لهُ تحتَ تأثيرِ تمددٍ مركزهُ نقطةُ الأصلِ، مستعملًا معاملَ التمددِ المعطى أسفلهُ:



أمثلُ المضلعَ المعطاةَ إحداثيات رؤوسه بيانيًا، ثمَّ أمثلُ صورتهُ الناتجةَ عن تمددٍ مركزهُ نقطةُ الأصلِ ومعامله العددُ k المحددُ في كلِّ مِنَ المسألتين الآتيتين:

10 $X(6, -1), Y(-2, -4), Z(1, 2); k = 3$





11 $T(9, -3), U(6, 0), V(3, 9), W(0, 0); k = \frac{2}{3}$

أستعد لدراسة الوحدة

أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة، أستعين بالمثل المحلول.

محيط الدائرة

أجد محيط كل دائرة ومساحتها في كل مما يأتي:



مثال: أجد محيط الدائرة المجاورة ومساحتها.

أولاً: أجد محيط الدائرة.

$$c = 2\pi r$$

صيغة محيط الدائرة

$$\approx 2 \times 3.14 \times 5$$

$$r = 5 \text{ و } \pi \approx 3.14$$

$$\approx 31.4$$

أجد الناتج

إذن، محيط الدائرة يساوي 31.4 cm تقريباً.

ثانياً: أجد مساحة الدائرة.

$$A = \pi r^2$$

صيغة مساحة الدائرة

$$\approx 3.14 \times (5)^2$$

$$r = 5 \text{ و } \pi \approx 3.14$$

$$\approx 78.5$$

أجد الناتج


إذن، مساحة الدائرة تساوي 78.5 cm² تقريباً.

الأشكال ثلاثية الأبعاد


مساحة الأشكال المركبة

أجد مساحة كل شكل مما يأتي:


1



2








3



مثال: أجد مساحة الشكل المجاور.

الخطوة 1: أفصل الشكل إلى مستطيلات.



الخطوة 2: أجد مساحة A_1 , A_2 , A_3

$$A = l \times w$$

$$A_1 = 3 \times 3 = 9 \text{ cm}^2$$

$$A_2 = 6 \times 3 = 18 \text{ cm}^2$$

$$A_3 = 9 \times 3 = 27 \text{ cm}^2$$

صيغة مساحة المستطيل

أعوّض

أعوّض

أعوّض

الخطوة 3: أجد مجموع المساحات.

$$A = A_1 + A_2 + A_3$$


$$= 9 + 18 + 27 = 54 \text{ cm}^2$$

أجد مجموع المساحات


أعوّض وأجد الناتج

أجد عدد مكعبات الوحدة التي يتكوّن منها كل مجسم ممّا يأتي:

1




2




أكمل رسم كل مجسم ممّا يأتي:

3



مكعب طول ضلعيه وحدتان


4




متوازي مستطيلات أبعاده: 3 وحدات، وحدتان، 4 وحدات

5 أرسّم المجسم الآتي بعد إضافة ثلاثة مكعبات فوقه في المكان المحدد:

أضيف 3 مكعبات هنا





6 يتكوّن متوازي المستطيلات أدناه من 12 مكعب وحدة، أرسم الشكل الناتج بعد إزالة المكعبين المظللين.





أرسم المساقط: العلوي، والأمامي، والجانبّي، لكلّ من المجسمات الآتية:


7



8





9 أكمل رسم المجسم الآتي باستعمال مسقطيه: الجانبي، والعلوي.




مسطح علوي		مسطح جانبي	
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□

10 أستعمل الورقة المثلثة المتساوية القياس أدناه والمساقط المجاورة له، لرسم المجسم من مكعبات وحدة.

مسطح علوي مسطح أمامي مسطح جانبي






مسبّح: بيّن الشكل المجاور مسبّحًا تميلُ قاعدتهُ مِنْ أحدِ الأطرافِ إلى الطرفِ الآخرِ:

1 هل المسبّحُ على شكلٍ منشورٍ؟ أبرّرْ إجابتي.


2 أجدُ كمّيّةَ الماءِ اللازمةَ لملءِ المسبّحِ.

أحدّدُ عددَ مستوياتِ التماثلِ لكلِّ مجسمٍ ممّا يأتي:






3



4









5 أرسمُ مستوياتِ التماثلِ الأربعةَ لهرمٍ قاعدتهُ مربعةٌ.



6 أكملُ رسمَ المجسمِ في الشكلِ المجاورِ، علمًا بأنَّ المستوى المظللَ مستوى تماثلٍ.


أجد مساحة سطح كل كرة أو نصف الكرة وحجمها مما يأتي. أقرب إجابتني لأقرب جزء من عشرة:



أجد مساحة سطح كل كرة وحجمها مما يأتي بدلالة π :




8 كرة محيطها 30 cm

7 كرة نصف قطرها 13 cm



9 لعبة من البلاستيك على شكل نصف كرة مجوفة من الداخل كما في الشكل المجاور. أجد كمية البلاستيك اللازمة لصنع الكرة.

أجد حجم كل مجسم مما يأتي:



الإحصاء والاحتمالات

أستعدُّ لدراسةِ الوحدةِ

أختبرُ معلوماتي قبلَ البدءِ بدراسةِ الوحدةِ، وفي حالِ عدمِ تأكدي منَ الإجابةِ، أستعينُ بالمثالِ المحلولِ.

مقاييسُ النزعةِ المركزيةِ

أجدُ الوسطَ الحسابيَّ، والوسيطَ، والمنوالَ، والمَدَى لكلِّ مجموعةِ بياناتٍ ممَّا يأتي:

1 43, 37, 35, 30, 41, 23, 33, 31, 82, 21

2 68, 55, 70, 6, 71, 58, 81, 82, 63, 79

مثال: أجدُ الوسطَ الحسابيَّ، والوسيطَ، والمنوالَ، والمَدَى لمجموعةِ البياناتِ الآتية:

28, 36, 18, 25, 12, 44, 18, 42, 34, 16, 30

الخطوةُ 1: أجدُ الوسطَ الحسابيَّ

$$\bar{x} = \frac{28+36+18+25+12+44+18+42+34+16+30}{11} = \frac{303}{11} \approx 27.5$$

أجمعُ القيمَ، وأقسمُها على عددها، ثُمَّ أبسِّطُ

الخطوةُ 2: أجدُ الوسيطَ

أرتبُ البياناتِ تصاعديًّا لأجدَ الوسيطَ:

12, 16, 18, 18, 25, 28, 30, 34, 36, 42, 44

الوسيطُ هوَ القيمةُ التي تتوسطُ البياناتِ، وبما أن عددَ البياناتِ فرديًّا، فإنَّ الوسيطَ يساوي 28

الخطوةُ 3: أجدُ المنوالَ

12, 16, 18, 18, 25, 28, 30, 34, 36, 42, 44

لإيجادِ المنوالِ أحددُ القيمةَ الأكثرَ تكرارًا وهي 18

إذن، المنوالُ هوَ 18

الخطوةُ 4: أجدُ المَدَى


لإيجادِ المَدَى أطرحُ أصغرَ قيمةٍ في البياناتِ منَ أكبرِ قيمةٍ:

$$R = 44 - 12 = 32$$

إذن، مَدَى البياناتِ هوَ 32

• إيجاد احتمال وقوع حادثٍ

لدى حينين مجموعة البطاقات الآتية، إذا سحبتَ حينين بطاقةً منها عشوائياً، فأجدُ احتمالَ سحبِ بطاقةٍ تحملُ:



3 الحرف R أو الحرف T

2 الحرف Z

1 الحرف S

مثال: لدى عمر مجموعة البطاقات الآتية، إذا سحبَ عمر بطاقةً منها عشوائياً، فأجدُ:



(1) احتمال سحب بطاقةٍ تحملُ مثلثاً.

عددُ النواتج الممكنة (الفضاء العيني) لهذه التجربة يُساوي 7، وعددُ عناصرِ هذا الحادثِ يُساوي 4؛ لأنَّ عددَ البطاقات التي تحملُ مثلثاً يُساوي 4

$$P(\text{مثلث}) = \frac{4}{7}$$

(2) احتمال سحب بطاقةٍ تحملُ خماسياً.

عددُ عناصرِ هذا الحادثِ يُساوي 0؛ لأنَّه لا توجد بطاقةٌ تحملُ شكلَ الخماسيِّ.

$$P(\text{خماسي}) = \frac{0}{7} = 0$$

(3) احتمال عدم سحب بطاقةٍ تحملُ دائرةً.


عددُ عناصرِ هذا الحادثِ يُساوي 6؛ لأنَّه توجدُ 6 بطاقاتٍ لا تحملُ دائرةً.

$$P(\text{ليست دائرة}) = \frac{6}{7}$$

(4) احتمال سحب بطاقةٍ تحملُ دائرةً أو مثلثاً.

عددُ عناصرِ هذا الحادثِ يُساوي 5؛ لأنَّه توجدُ بطاقةً واحدةً تحملُ دائرةً و 4 بطاقاتٍ تحملُ مثلثاً، ومجموعُها يُساوي 5

$$P(\text{دائرة أو مثلث}) = \frac{5}{7}$$



معتدماً تمثيل الصندوق ذي العارضتين المزدوج المجاور، أجب عن الأسئلة الآتية:

1 ما القيمة الصغرى في مجموعة البيانات A.

2 ما القيمة الكبرى في مجموعة البيانات B.

3 أي مجموعة البيانات لها أكبر مدى ربيعي (IQR)؟

4 أي المجموعتين لها أكبر مدى؟

عدد دقائق التمارين الرياضية		
	السبت	الأحد
ليان	45	30
هشام	40	55
سامي	45	35
فرح	55	60
هالة	60	45
راكان	90	75


يبين الجدول المجاور عدد الدقائق التي يقضيها مجموعة من الأشخاص في أداء التمارين الرياضية يومي السبت والأحد:

5 أجد المدى والمدى الربعي (IQR) للبيانات في كل يوم.

6 أمثل بيانات اليومين بالصندوق ذي العارضتين المزدوج.

7 أي اليومين بياناته أكثر تشتتاً؟ أبرر إجابتي.

يبين تمثيل الصندوق ذي العارضتين الآتي أعداد طلبة المرحلة الأساسية في مدارس المدينة (أ)، أما مدارس المدينة (ب) فإن أقل عدد من الطلبة فيها 280 طالباً، وأكبر عدد من الطلبة 1820 طالب، ووسيط أعداد الطلبة 1400 طالب، والربيع الأدنى 1100 طالب، والربيع الأعلى 1600 طالباً:







8 أمثل بيانات المدينة (ب) على التمثيل السابق نفسه.

9 أصف الفروق بين مجموعتي البيانات.


أختار التمثيل الذي يمكن من خلاله الحصول على:

- 1 الوسيط لمجموعة من البيانات.
- 2 القيمة العظمى لمجموعة من البيانات.
- 3 المنوال لمجموعة من البيانات.
- 4 التكرار لفئة معينة من البيانات.

- 5 يبين التمثيلان الآتيان الأرباح السنوية لإحدى الشركات. أي التمثيلين يُعطي انطباعاً بأن أرباح الشركة تزداد سريعاً؟ أبرر إجابتي.



- 6 سأل رامي 40 امرأة و40 رجلاً إن كانوا ينظفون أسنانهم مرتين على الأقل في اليوم، ومثل النتائج بالقطاعات الدائرية المجاورة. أكتب استدلالين اعتماداً على التمثيل.



- 7 صممت براءة استبانة سألت فيها طالبات من مدرستها عن الرياضة المفضلة لديهن، ومثلت النتائج التي حصلت عليها بالتمثيل بالأعمدة المجاورة.

تقول براءة: «أتوقع من التمثيل البياني أن نصف عدد طالبات المدرسة يفضلن كرة القدم». هل استدلال براءة صحيح؟ أبرر إجابتي.

المرطبات	الفطائر
عصير برتقال	بيض
حليب	جبنة
ماء	لحم

يريدُ جهاذُ اختيارَ وجبةٍ من فطيرةٍ ومرطّبٍ.

- 1 أستعملُ مخطّطَ الشجرة لتحديدِ الخياراتِ الممكنةِ أمامَ جهاذٍ.
- 2 أجدُ عددَ الخياراتِ الممكنةِ أمامَ جهاذٍ.




- 3 سحبْتُ كرةً عشوائياً من الكيسِ A، ثمَّ سحبْتُ كرةً عشوائياً من الكيسِ B. أستعملُ مخطّطَ الاحتمال لتحديدِ الفضاءِ العينيِّ للتجربةِ.

- 4 أجدُ عددَ عناصرِ الفضاءِ العينيِّ.

	R	B	G
R	R, R	R, B	R, G
B			
G			


سحبْتُ كرتين عشوائياً على التوالي مع الإرجاع من كيسٍ يحتوي ثلاث كراتٍ متماثلة ألوانها: أحمر (R)، أزرق (B)، أخضر (G).

- 5 أكمل الجدول المجاور، ثمَّ أحددُ الفضاءِ العينيِّ للتجربةِ.
- 6 أجدُ عددَ عناصرِ الفضاءِ العينيِّ.



- 7 أستعملُ الجدول لتحديدِ الفضاءِ العينيِّ لتجربةِ رمي قطعة نقدٍ مرّةً واحدةً عشوائياً، وتدوير مؤشّر القرص المجاور مرّةً واحدةً عشوائياً.

- 8 **مكتبات:** تباعُ مكتبةٌ ثلاثة ألوانٍ من بطاقاتِ الملاحظات: أصفر، أخضر، أزرق، ومن كل لونٍ توجدُ ثلاثة أحجامٍ مختلفة: صغير، وسط، كبير. أستعملُ مخطّطَ الشجرة لتحديدِ الخياراتِ الممكنةِ جميعها لشراء بطاقةٍ ملاحظةٍ.



سحبتَ جَنِي بطاقةً عشوائياً مِنْ كُلِّ مجموعةٍ مِنْ مجموعتيّ البطاقاتِ المجاورةِ، ومثلتَ الفضاءَ العينيّ للنواتجِ المحتملةِ في الجدولِ أدناه. أجدُ احتمالَ:

1 سحبِ مثلثٍ واحدٍ فقط.

2 سحبِ شكلينِ لونُهُما أبيض.

3 سحبِ شكلينِ لونُهُما أسود.

4 ألا يكونَ أحدُ الشكلينِ المسحوبينِ دائرةً.

5 أن يكونَ عددُ أضلاعِ الشكلينِ المسحوبينِ أكبرَ

أو يساوي 5

المجموعة A

	○	■	⬡	▶
●	○●	■●	⬡●	▶●
□	○□	■□	⬡□	▶□
⬢	○⬢	■⬢	⬡⬢	▶⬢
▶	○▶	■▶	⬡▶	▶▶

المجموعة B

الكيسُ A



الكيسُ B




يملكُ سامي كيسينِ مِنَ الكُرَاتِ الزجاجةِ. ألوانُ الكُرَاتِ فِي كُلِّ كيسٍ: أزرق، أحمر، أخضر. إذا سحبَ سامي كرةً عشوائياً مِنْ كُلِّ كيسٍ، فأجدُ احتمالَ:


6 أن يكونَ للكرتينِ المسحوبتينِ اللونُ نفسه.

7 أن تكونَ إحدى الكُرَاتِ المسحوبةِ على الأقلَ لونهاً أحمر.

القرصُ A



القرصُ B



في تجربةِ تدويرِ مؤشريّ القرصينِ A و B المجاورينِ مرّةً واحدةً عشوائياً وإيجادِ مجموعِ العددينِ اللذينِ يقفُ عندهُما مؤشرُ كُلِّ قرصٍ، أجدُ احتمالَ أن يكونَ مجموعُ العددينِ:


8 يساوي 5

9 أكبرَ مِنْ 5

في تجربةِ رميِ 3 قطعِ نقدٍ متمايزةٍ مرّةً واحدةً عشوائياً وتسجيلِ الوجهِ الظاهرِ، أستعملُ مخططَ الشجرةِ لأجدَ احتمالَ:


10 ظهورِ صورةٍ واحدةٍ على الأقل. 11 ظهورِ كتابةٍ مرتينِ فقط. 12 عدمِ ظهورِ كتابةٍ.

ورقة منقطة متساوية القياس




ورقة منقطة متساوية القياس

ورقة منقطة متساوية القياس




ورقة منقطة متساوية القياس




ورقة منقطة متساوية القياس

ورقة منقطة متساوية القياس



ورقة منقطة متساوية القياس



ورقة منقطة متساوية القياس

ورقة منقطة متساوية القياس

